

Publikujeme v zahraničí

Cévní patologie u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou Vascular pathology in patients with idiopathic Parkinson's disease

**Rektor I., Goldemund D., Sheardová K.,
Rektorová I., Michálková Z., Dufek M.**

Abychom prozkoumali vliv patologie moz-
kových cév na klinický stav Parkinsonovy cho-
roby (PCH), srovnali jsme u 57 po sobě jdoucích
pacientů klinická a neuropsychologická data
s klinickými a MR projevy cévního onemocnění
mozku a ultrazvukovými vyšetřeními mozko-
vých cév.

Přestože přítomnost cévního onemocnění
mozku byla diagnostikována vzácně, byla zjiště-
na významná korelace mezi klinickým a kogni-
tivním stavem a intimomediální tloušťkou, která
je ukazatelem postižení velkých cév. Kognitivní
stav byl významně spojen s pulzatilním inde-
xem (ukazatel postižení malých cév). Tato studie
poskytuje důkaz, že subklinická cévní patologie
by mohla ovlivnit klinický stav tím, že přispívá
k motorické a kognitivní dysfunkci u PCH.

Parkinsonism and Related Disorders

2009; 15: 24–29.

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

1. neurologická klinika,

1. LF MU a FN u sv. Anny, Brno