

Neurologové se ptají...

Jak vybírat pacienta vhodného pro baklofenovou pumpu? Kam a na koho se obrátit, pokud vhodného pacienta najdu?

V. M., Brno

K léčbě intratekálním baklofenem pomocí pumpového systému s kontinuálním uvolňováním léku jsou vhodní nemocní s těžkou generalizovanou spasticitou, která vede ke zhoršení pohyblivosti a soběstačnosti nemocného, je zdrojem dalších komplikací (dekubity, chronická bolest, infekce, fixované svalové kontraktury), vadí při hygieně, oblékání, přesunech na vozík. Jde zejména o pacienty po chronickém míšním poranění, nemocné s roztroušenou sklerózou, DMO nebo po traumatickém poranění mozku.

Základním kritériem výběru je těžká spasticita (podle modifikované stupnice svalového hypertonu dle Ashwortha stupeň 3–4) a nedostatečná klinická odpověď na perorální antispastické léky nebo nežádoucí účinky při vysokých dávkách léků. Nutná je kladná klinická odpověď na jednorázové intratekální podání baklofenu, které se provádí za hospitalizace. Pacient musí rozumět této léčbě, být obeznámen s jejími riziky a podepsat podrobný informovaný souhlas. Nezbytná je dobrá komunikace s rodinou pacienta.

Vylučujícími kritérii jsou probíhající infekční onemocnění, závažná interní, metabolická a psychiatrická onemocnění, dekubity, alergie na baklofen nebo na části pumpového systému a výrazné koagulační poruchy.

Tato metoda je vyhrazena pro těžce postižené nemocné a má svá omezení i rizika. Musí

být prováděna speciálně vyškoleným týmem lékařů a ošetřovatelů.

V současné době se testování a implantace baklofenové pumpy provádí na těchto pracovištích, kam je možné zaslat lékařskou zprávu a doporučení: dospělí – Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha nebo Neurochirurgická klinika FN Olomouc; děti – Neurochirurgická klinika FN Motol Praha.

doc. MUDr. Ivana Štětkařová, CSc.

Neurologické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
ivana.stetkarova@homolka.cz

