

Vážení čtenáři, na stránkách Neurologie pro praxi se budete v každém čísle setkávat s autodidaktickým testem, který ověří, jak zvýšily vaši informovanost publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v příštím čísle časopisu. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných člancích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Mezi rizikové faktory pro přechod akutního zosteru do postherpetické neuralgie patří:

- a) rozsáhlé lokální kožní léze
- b) lokalizace v oblasti trigeminu
- c) změny citlivosti v postižené oblasti
- d) silné bolesti v akutním období kožních erupcí

2 Neuropatická bolest:

- a) u těžší formy meralgia paresthetica může dojít i ke slabosti stehenního svalstva
- b) komplexní regionální bolestivý syndrom může vzniknout po infarktu myokardu nebo cévní příhodě mozku
- c) primární idiopatická interkostální neuralgie (má neznámou příčinu) se vyskytuje až v 50 %
- d) proximální diabetická amyotrofie může být i oboustranná

3 Mezi akutní bolestivé stavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní patří:

- a) neuralgie trigeminu
- b) Lhermitteův příznak
- c) dysestézie končetin
- d) bolestivé tonické spazmy

4 Nejčastější výskyt mozkových metastáz je:

- a) u kolorektálního karcinomu
- b) u plicního karcinomu
- c) u melanomu
- d) u karcinomu prsu

5 Antikonvulziva v terapii mozkových metastáz :

- a) jsou indikována u všech pacientů s mozkovými metastázami
- b) jsou podávána profylakticky
- c) jsou indikována jen u pacientů s epileptickými záchvaty
- d) preferovány jsou karbamazepiny

6 RLS se u dětí projevuje:

- a) nucením k pohybu dolními končetinami
- b) sníženými reflexy na dolních končetinách
- c) příznaky podobnými ADHD
- d) nespavostí

7 Pro RLS u dětí platí:

- a) vyskytují se velmi vzácně
- b) vyskytují se asi u 2% dětí
- c) souvisí s deficitem železa
- d) k diagnostice je vždy nutná noční polysomnografie

8 Na sekundární bolest hlavy musíme myslet:

- a) jde-li o opakující se epizodické bolesti hlavy

- b) jde-li o náhlou velmi silnou bolest hlavy u pacienta, který na bolest hlavy dosud netrpěl
- c) má-li bolest hlavy známé provokační faktory
- d) jde-li o nově vzniklou bolest hlavy po 50. roce věku

9 Akutní bolest hlavy spojená s význačnou trupovou ataxií je projevem nejčastěji:

- a) cerebrální žilní trombózy
- b) chronického subdurálního hematomu
- c) mozečkového krvácení
- d) virové meningitidy

10 Postupný rozvoj bolestí hlavy s psychickými příznaky bývá projevem:

- a) chronického subdurálního hematomu
- b) disekce vnitřní karotidy
- c) mozečkového krvácení
- d) mozkového nádoru

11 Které návykové látky mohou vyvolat tzv. intoxikační delirium?

- a) pouze delirogeny
- b) amfetaminy a kokain
- c) alkohol
- d) alkohol, hypnotika, benzodiazepiny, amfetaminy, kokain, solvencia, delirogeny

12 Proč se nedoporučuje podávat pacientům s deliriem tremens nebo intoxikačním deliriem antipsychotika?

- a) protože nedostatečně tlumí úzkost pacienta
- b) pro riziko útlumu dechového centra
- c) protože vyvolávají prodloužení QT intervalu na EKG s rizikem komorové tachykardie či fibrilace
- d) podávání antipsychotik u deliria tremens je správné a bezpečné

13 PPMS postihuje:

- a) častěji ženy ako mužov
- b) častěji mužov ako ženy
- c) ženy a mužov približne v rovnakom pomere
- d) 10-15% pacientov so sclerosis multiplex

14 Pro Ménièreovu chorobu je typická přítomnost:

- a) tinnitu
- b) hypakuze
- c) polohově vázaných závratí
- d) vertikálního nystagmu

15 Léčba BPPV spočívá v:

- a) psychoterapii
- b) provedení repozičních manévrů

- c) podání bolusové dávky kortikoidů
- d) podání antiemetik v kombinaci s kortikoidy

16 Akutně vzniklý jednostranný periferní vestibulární syndrom bez poruchy sluchu nacházíme u:

- a) vestibulární neuronitidy
- b) ataky Méniérovy choroby
- c) vestibulární migrény
- d) BPPV

17 Pro vestibulární migrénu je typická:

- a) záchvatovitá závrať trvající několik hodin
- b) záchvatovitá závrať trvající několik dní
- c) bolest hlavy s maximem okcipitálně
- d) tinnitus

18 MG lze navodit:

- a) podáním penicilaminu
- b) podáním interferonu alfa
- c) podáním analgetik
- d) v rámci reakce štěpu proti hostiteli

19 Základními příznaky deliria jsou:

- a) kvalitativní porucha vědomí, porucha pozornosti, vnímání a myšlení, paměti, psychomotoriky, emocí a cyklu spánek-bdění
- b) porucha myšlení, poznávání a chápání, deprese
- c) kvantitativní porucha vědomí, poruchy vnímání a paměti, zrychlení psychomotorického tempa a neklid
- d) kvantitativní a kvalitativní porucha vědomí, iluze a halucinace, poruchy myšlení a chápání, zhoršení paměti

20 V léčbě demence Alzheimerova typu ve středně pokročilém stadiu je dle současných poznatků indikována tato léčba:

- a) piracetam
- b) inhibitory acetylcholiesterázy
- c) kyselina acetylsalicylová
- d) memantin

Garant autodidaktického testu: doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

Správné řešení z minulého čísla: 1. c 2. a, b, d 3. c 4. b, c 5. c 6. b, c 7. a, d 8. a, b 9. d 10. c 11. c, d
12. c, d 13. a, b, c, d 14. b, c, d 15. c 16. a 17. a, b, d 18. b, c 19. a, b, c, d 20. a, b, c