

Spontánní intracerebrální krvácení – úvod tématu

MUDr. Miroslav Kalina – editor hlavního tématu

Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

Neurol. praxi 2011; 12 (2): 79

Spontánní intrakraniální krvácení (ICH) je příčinou zhruba 20 % celkového počtu CMP, z toho je přibližně 15 % intracerebrálních a 5 % subarachnoidálních krvácení. Mortalita na intracerebrální krvácení (ICH = intracerebrální hematoma) do jednoho měsíce je kolem 50 % a roční mortalita přesahuje 57 %. Přibližně 50 % ICH jsou hluboká krvácení do bazálních ganglií, 35 % jsou lobární, 10 % mozečková a 5 % kmenová. Nejvýše 20 % nemocných dosáhne po ICH schopnosti nezávislého života.

Z hlediska příčin, klinického obrazu i léčby se jedná stejně jako u ischemického iktu o velmi rozmanitou skupinu. Mírný úbytek hypertonických krvácení v důsledku lepší kontroly hypertenze ve vyspělých zemích je vyvážen

krváceními, která komplikují antiagregační, trombolytickou a zejména antikoagulační léčbu.

Vzhledem k absolutnímu počtu kolem 8000 ICH za rok v České republice jde nepochybně o velmi závažné téma. Znalosti o možných příčinách a léčebných postupech u ICH mají zásadní význam, protože lze předpokládat, že s uvedením systému Iktových a Komplexních cerebrovaskulárních center do praktického života se zvýší dostupnost vysoce sofistikovaných diagnostických i léčebných metod. Ty by měly nejen snížit mortalitu, ale zejména zvýšit procento nemocných vracejících se do nezávislého samostatného života i po tak závažném stavu, jakým je ICH.

V tomto čísle proto prezentujeme soubor textů, které shrnují současné poznatky o příčinách, diagnostice a konzervativní i invazivní léčbě ICH.

MUDr. Miroslav Kalina

Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
miroslav.kalina@homolka.cz