

5

perorální levodopa  
alespoň 5krát denně

2

2 hodiny bdělého času  
ve stavu OFF

1

1 hodina denně  
s nepříjemnou dyskinezí

## Konsenzus k určení pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci<sup>1</sup>

Identifikace pacientů progredujících do pokročilého stadia onemocnění a vhodnost pro intervenční léčbu, umožňuje všeobecným neurologům posoudit potřebu doporučení na specializované pracoviště a zlepšit tak kvalitu péče a stav pacienta.

### Ukazatele pokročilého stadia PN<sup>1</sup>

Pořadí klinicky nejvýznamnějších ukazatelů	Motorické příznaky	Nemotorické příznaky	Funkční dopad
1.	Středně závažné nepříjemné motorické výkyvy	Mírná demence	Opakované pády navzdory optimální léčbě
2.	<b>Alespoň 2 hodiny bdělého času ve stavu OFF</b>	Přetrvávající nepříjemné halucinace	Potřebuje pomoc s každodenními činnostmi alespoň po určitou dobu
3.	Alespoň 1 hodina denně s nepříjemnou dyskinezí	Středně závažná psychóza	Neschopnost provádět komplexní úkoly alespoň po určitou dobu
4.	Středně závažná dyskineze	Fluktuace nemotorických příznaků	Středně závažná porucha mobility
5.	Nepříjemná dysfagie	Středně závažné poruchy spánku	
6.	<b>Každodenní podávání perorální levodopy více než 5krát denně</b>		

### Ukazatele vhodnosti pro intervenční léčbu<sup>1</sup>

Motorické příznaky	Nemotorické příznaky	Funkční dopad
<ul style="list-style-type: none"> <li>Střídání stavů nepříjemných dyskinezí a OFF stavu</li> <li>Alespoň 2 hodiny času v OFF stavu</li> <li>Posturální nestabilita ve stavu OFF</li> <li>Dystonie s bolestí</li> <li>Zamrznutí chůze během OFF stavu (freezing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poruchy spánku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omezení každodenních činností</li> </ul>

**Reference:** 1. Antonini A, et al. Curr Med Res Opin. 2018;34(12):2063–73; PN – Parkinsonova nemoc, Intervenční léčba = v tomto případě přístrojem asistovaná léčba (pumpové systémy nebo hluboká mozková stimulace)